

# TERMINURIC

**REDUZ O EXCESSO  
DE ÁCIDO ÚRICO  
NO CORPO  
HUMANO**



**ANTIOXIDANTE**

**SAÚDE DAS  
ARTICULAÇÕES**

**CONTROLE DOS NÍVEIS  
DE ÁCIDO ÚRICO**

## FATORES DE RISCO

A gota é uma forma de artrite inflamatória causada por uma desordem metabólica (hiperuricemia) que leva à deposição de cristais de ácido úrico em tecidos e fluidos dentro do corpo. Os fatores de risco relacionados à gota incluem: excesso de peso ou obesidade, hipertensão, ingestão de álcool, uso de diuréticos, dieta rica em purina e frutos do mar além do funcionamento inadequado dos rins.


O surgimento do quadro agudo ocorre quando os cristais de urato presentes nas articulações provocam inflamação, caracterizada por dor, vermelhidão, inchaço e calor. Em relação ao quadro crônico, é caracterizado por artrite crônica, com dores nas juntas.

**Terminuric** é derivado da planta *Terminalia Bellerica*, tendo como compostos bioativos os taninos, particularmente, em condições como a artrite e a gota. Terminuric possui atividade anti-inflamatória devido à inibição da enzima xantina oxidase, além de ser um potente agente antioxidante.

## AVALIAÇÃO DA EFICÁCIA DO EXTRATO AQUOSO DA TERMINALIA CHEBULA E TERMINALIA BELLERICA EM INDIVÍDUOS COM HIPERURICEMIA

Um estudo randomizado, duplo-cego, controlado por placebo, foi realizado ao longo de 24 semanas, para avaliar a eficácia dos extratos de Terminalia chebula (500mg/dia); Terminuric (500mg/dia), Terminuric (250mg/dia) e Febuxostate (40mg/dia) no tratamento de 88 pacientes portadores de hiperuricemia.

Ao final de 24 semanas de tratamento o grupo Terminuric (500mg) apresentou uma redução de 27% nos níveis de ácido úrico perdendo apenas para o grupo Febuxostate (40mg) que foi de 48% (Figura 1). Portanto o uso de Terminuric é uma alternativa natural, sem causar efeitos colaterais para auxiliar no controle dos níveis de ácido úrico e tratamento da Gota.



**Figura 1:** Alteração Percentual média nos níveis de ácido úrico após o tratamento.

## SUGESTÃO DE FÓRMULA

Tratamento da hiperuricemia

Terminuric ..... 500mg

Modo de Usar: tomar uma dose, uma vez a dia

Concentração recomendada:

500mg ao dia

Para mais informações, fale conosco:

### Laisa Celso

Proprietária e Farmacêutica Responsável

Especialista em Manipulação Magistral Alopática e

Manipulação Estética | CRF/SC - 3833



(48) 98801-2749

### Idinei Soares

Proprietário

[idineisoares@gmail.com](mailto:idineisoares@gmail.com)



(48) 98801-1100

Fonte: Via Farma. Referências bibliográficas: Terkeltaub RA. Gout. N Engl J Med. 2003;349(17):1647-1655. Usharani P, Notalapati C, Pokuri V, Kumar U, Taduri G. A randomized, double-blind, placebo-, and positive-controlled clinical pilot study to evaluate the efficacy and tolerability of standardized aqueous extracts of Terminalia chebula and Terminalia bellerica in subjects with hyperuricemia. Clinical Pharmacology: Advances and Applications. 22 June 2016 Volume 2016:8 Pages 51—59