



Colegio San Isaac Jogues
R.B.D. 24769-3
Lo Cruzat 164
Fono: 6035558
Quilicura

INFORMATIVO VACUNAS AÑO 2017

Sr(a) Apoderado(a):

Se hace llegar a usted información IMPORTANTE enviada desde el CESFAM Manuel Bustos respecto de las medidas que se tomarán este año en el Proceso de vacunación a nivel nacional. Esta información va dirigida a los alumnos de 1°-4°-5°-8° básico. Se les recuerda que la vacuna es de carácter **obligatorio**, se adjunta documentación enviada desde Ministerio de Salud que refuerza la obligatoriedad de este procedimiento.

Para este año 2017 padres que rechacen la administración de la vacuna **deben acudir al vacunatorio de nuestro CESFAM MANUEL BUSTOS ubicado en AVENIDA LO CRUZAT #486, a firmar el formulario de rechazo respectivo en los horarios de LUNES a VIERNES de 8:30 hasta 16:30 horas horario continuado.**

Por indicación del Servicio de Salud Metropolitano Norte no se pueden enviar esta solicitud a los padres, sino que deberán venir personalmente a rechazar esta vacuna, para el momento en que se vaya a vacunar a los niños **solo NO se procederá a vacunar a los menores cuyos padres hayan acudido previamente a firmar dicho rechazo a nuestro Establecimiento.**

Vacunas a administrar según curso

Niños y niñas de 1er año básico:

- Vacuna Tres Vírica (Sarampión, Paperas, Rubeola).
- Vacuna dTpa (Tos Convulsiva, Difteria, Tétanos).

Niñas de 4to Básico

- Vacuna Virus Papiloma Humano (VPH) tetravalente, 1° dosis.

Niñas de 5to Básico

- Vacuna Virus Papiloma Humano (VPH) tetravalente, 2° dosis.

Niños y niñas 8vo año básico:

- Vacuna dTpa (Tos Convulsiva, Difteria, Tétanos).

DESCRIPCION DE LAS VACUNAS Y PRINCIPALES REACCIONES ESPERADAS.

VACUNA TRES VIRICA: Vacuna que protege contra las enfermedades tales como Sarampión, Rubéola y Paperas. Dentro de las reacciones adversas que se pueden presentar: dolor en el sitio de punción, dolor articular, tos, cefalea, congestión nasal, exantema leve (manchas rojas leves).

No se vacunan:

Niños con fiebre superior a 38.5 ° C.

Niños en tratamiento con Inmunoglobulina.

Historia de anafilaxia severa (reacción alérgica severa) con dosis previa o a la proteína del huevo o algún componente de la vacuna (Gelatina – Neomicina).

VACUNA dTpa: Vacuna que protege contra enfermedades tales como: Difteria, Tos Convulsiva y Tétanos, esta vacuna no debe administrarse en caso de **fiebre, embarazo y lactancia**. Dentro de las reacciones adversas que se pueden presentar esta:

Niños: Dolor, hinchazón y eritema (enrojecimiento en el sitio de punción); cansancio, falta de apetito, cefalea, diarrea.

Adolescentes: Dolor, hinchazón y eritema (enrojecimiento en el sitio de punción); cefalea, dolor corporal, cansancio.



Colegio San Isaac Jogues
R.B.D. 24769-3
Lo Cruzat 164
Fono: 6035558
Quilicura

VACUNA VPH (VIRUS PAPILOMA HUMANO): Vacuna Tetravalente, puede generar reacciones leves tales como: dolor local, aumento de volumen, prurito (picazón) y hematoma en el lugar de la punción.

Muy poco frecuentemente cefalea, fiebre, artralgia, mialgia, mareos, trastornos gastrointestinales, y náuseas.

*****Si su hijo recibe algún tratamiento farmacológico especial infórmelo*****