

# Αλγόριθμος εμβολιασμού για την ιλαρά λόγω της πρόσφατης επιδημίας

## Έτος γέννησης

- Πριν το 1970: Δε χρειάζεται εμβολιασμός
- Από το 1970 και μετά: Μία ή δύο δόσεις MMR αναλόγως του εμβολιαστικού ιστορικού

## Επιβεβαιωμένη νόσηση

- Ναι: Δε χρειάζεται εμβολιασμός
- Όχι: Μία ή δύο δόσεις MMR αναλόγως του εμβολιαστικού ιστορικού

## Εμβολιαστικό ιστορικό

- Καμία δόση: Δύο δόσεις MMR
- Μία δόση μονοδύναμου ή τριδύναμου εμβολίου: Δεύτερη δόση MMR
- Δύο δόσεις εμβολίου: Δε χρειάζεται εμβολιασμός

## Ηλικία

- Βρέφη (<1 έτους): Δε γίνεται εμβολιασμός
- Νήπια (>1 έτους): Πρώτη δόση στους 12 μήνες, δεύτερη δόση στους 15 μήνες ή το συντομότερο αν έχει περάσει το τρίμηνο
- Μεγαλύτερα άτομα: Δύο δόσεις με μεσοδιάστημα 28 ημερών

## Έλεγχος αντισωμάτων

- Για την εργαστηριακή διάγνωση κρούσματος ιλαράς
- Για την ανίχνευση, παρακολούθηση και τον εντοπισμό επιδημιών για λόγους/ σκοπούς δημόσιας υγείας
- Σε συγκεκριμένες κλινικές περιπτώσεις, κατόπιν ιατρικής απόφασης (π.χ. ανοσοκατεσταλμένοι, εμφάνιση ιδιοπαθούς θρομβοπενικής πορφύρας μετά την πρώτη δόση)

## Ειδικό πληθυσμό

- Έγκυες: Δε γίνεται εμβολιασμός
- Ανοσοκατεσταλμένοι: Δε γίνεται εμβολιασμός
- Θηλάζουσες: Διενεργείται κανονικά ο εμβολιασμός
- Υγειονομικοί: Διενεργείται κανονικά ο εμβολιασμός με όσες δόσεις υπολείπονται μέχρι τις 2 ακολουθώντας το προβλεπόμενο χρονοδιάγραμμα.
- Συγχορήγηση εμβολίων: όλα τα εμβόλια μπορούν να συγχορηγηθούν είτε την ίδια ημέρα είτε με οποιαδήποτε χρονικό διάστημα, εκτός συγκεκριμένων εξαιρέσεων.