



A BRASPEN/SBNPE é a exclusiva detentora de todos os direitos autorais sobre o logotipo utilizado na campanha “DIGA NÃO à DESNUTRIÇÃO”. A Sociedade permite a reprodução e utilização da logo e do material a ela correlato, como forma de propagação da campanha e alcance do objetivo primordial, qual seja, a erradicação da desnutrição no ambiente hospitalar.

Ressalvamos, contudo, que não é permitida qualquer modificação ou alteração do logotipo, bem como do material correlato, por se tratar de patente protegida por direito autoral, conforme previsto na Lei n.º 9.610, de 19 de fevereiro de 1998 (que altera, atualiza e consolida a legislação sobre direitos autorais e dá outras providências).





### **I - Implemente pelo menos dois Indicadores de Qualidade**

Um indicador é unidade de medida de atividade específica ou uma medida quantitativa que pode ser usada como guia para monitorar e avaliar a qualidade de importantes cuidados providos ao paciente, bem como as atividades dos serviços. Neste sentido, a campanha sugere que pelo menos dois indicadores sejam aplicados rotineiramente. Um indicador que faça o monitoramento da terapia nutricional, haja vista a discrepância entre necessidades nutricionais e o que é realmente de fato ofertado e, outro indicador que controle as intercorrências relacionadas à TN, tais como hiperglicemia, diarreia, constipação, infecção de cateter venoso central, entre outras. Como sugestão, propõe-se:

- 1.) Frequência de pacientes que recebem menos de 70% das necessidades nutricionais prescritas;
- 2.) Frequência de pacientes com intercorrências relacionadas à terapia nutricional.

Exemplos de ficha técnica do indicador de qualidade:

**Tabela 15** - Frequência de diarreia em pacientes com nutrição enteral (NE)

<b>Objetivo estratégico</b>	Controle dos episódios de diarreia em pacientes com NE
<b>Nome do indicador</b>	Frequência de episódios de diarreia em pacientes com NE
<b>Descrição</b>	Mensurar a taxa de ocorrência de diarreia (3 ou mais evacuações líquidas/dia) em pacientes com nutrição enteral
<b>Propósito/justificativa</b>	Conhecer a incidência de diarreia em pacientes que fazem uso de nutrição enteral e tomar medidas preventivas e terapêuticas para diminuir esta complicação
<b>Fórmula</b>	A.) <u>N° de pacientes em NE que apresentam diarreia X100</u>  N° de pacientes em NE B.) <u>Por paciente</u> <u>N° de dias com diarreia em NEX100</u>  N° de dias de NE
<b>Unidade de medida</b>	Porcentagem
<b>Fonte de dados</b>	Prontuário médico, ficha de seguimento da TN
<b>Frequência</b>	Mensal
<b>Meta</b>	<10%
<b>Responsável pela informação</b>	Nutricionista, EMTN, equipe de enfermagem, equipe médica
<b>Responsável pela tomada da decisão</b>	Chefe da EMTN
<b>Data de implementação do indicador</b>	

**Tabela 16** - Frequência de pacientes que recebem menos de 70% das necessidades prescritas

<b>Objetivo estratégico</b>	Controle dos pacientes que recebem menos de 70% das necessidades prescritas
<b>Nome do indicador</b>	Frequência de pacientes que recebem menos de 70% das necessidades prescritas
<b>Descrição</b>	Mensurar a taxa de ocorrência de pacientes que recebem menos de 70% das necessidades prescritas
<b>Propósito/justificativa</b>	Conhecer a incidência e a razão dos pacientes não receberem suas necessidades prescritas
<b>Fórmula</b>	$\frac{\text{N}^\circ \text{ de pacientes em TN que recebem menos de 70\% das necessidades prescritas} \times 100}{\text{N}^\circ \text{ de pacientes em TN}}$
<b>Unidade de medida</b>	Porcentagem
<b>Fonte de dados</b>	Prontuário médico, ficha de seguimento da TN
<b>Frequência</b>	Mensal
<b>Meta</b>	<20%
<b>Responsável pela informação</b>	Nutricionista, EMTN, equipe de enfermagem, equipe médica
<b>Responsável pela tomada da decisão</b>	Chefe da EMTN
<b>Data de implementação do indicador</b>	