

Clavulinopsis helvola (Pers. : Fr.) Corner 1950

Clavaire jaunâtre Clavaire jaune pâle



Photo © ChampYves

Division : Basidiomycota
S/Division : Agaricomycotina
Classe : Agaricomycètes
S/Classe : Agaricomycetidae
Ordre : Clavariales
Famille : Clavariaceae
Genre : Clavulinopsis

Particularités : 60 x 4 mm. au maximum, filiforme, cylindrique à légèrement clavée, le plus souvent ondulée, tordue, torsadée, jaune vif généralement pâle à la base, lisse ou faiblement inégale, extrémités arrondies non ramifiées, surface lisse ;

Chair : jaune clair, molle, saveur douce, sans odeur ;

Spores : sporée blanchâtre ;
 spores hyalines, verruqueuses, arrondies elliptiques, 6 x 5,5 µm ;

Comestibilité : non comestible.

Clavulinopsis helvola est un champignon (si, si) de 20 à 70 mm. de hauteur, **vermiculaire**, plus ou moins ondulé tordu ou torsadé, cylindrique à légèrement clavé, peu épais (max 4 mm.) et qui pousse généralement isolé, en petites troupes ou (plus rare) cespiteux en grappes de quelques exemplaires (5 à 7).

Il fréquente, de novembre à décembre, les lieux ombrés et relativement humides : herbes moussues des prairies, pâturages et bois. (Les exemplaires photographiés poussent en petites troupes éparées en lisière de pessière dans la bande des 2 mètres, plein nord, dans l'herbe complètement envahie de mousse, le soleil n'y étant jamais présent directement.)

Malgré une coloration vive (jaune d'or ou jaune d'oeuf, plus pâle vers la base) qui tranche franchement avec son environnement (lieux ouverts, herbe moussue des prairies), cette clavaire, de part sa taille, est bien difficile à apercevoir, et sans une attention particulière, vous passerez à ses côtés sans rien voir.

La spore est assez particulière (photo 4) : elle est subsphérique et fortement verruqueuse, **échinulée**, typique de cette espèce et lèvera le doute si besoin.

Clavulinopsis helvola var. *geoglossoides* Corner présente une fructification aplatie et sillonnée longitudinalement.

Confusions possibles :

- *Clavulinopsis fusiformis*, la Clavaire en fuseau, qui s'en distingue par l'amertume de sa chair ;

- *Calocera viscosa*, la Calocère visqueuse, à la chair très coriace et qui vient sur billes pourries ou débris de bois plus ou moins enterrés et plutôt sous conifères ;

- *Calocera cornea*, la Calocère cornée, coriace elle aussi mais bien plus petite et sur elle aussi sur débris de bois, mais de feuillus.

- Synonymes latins :	- Autres noms vernaculaires :	- Autres langues :
----------------------	-------------------------------	--------------------

(DE) : allemand : Goldgelbe Wiesenkeule
(UK) : anglais : Yellow Club Fungus
(DK) : danois : Oransegul køllesvamp
(FI) : finnois : Oranssinuijakas
(JP) : japonais : キソウメンタケ
(NL) : néerlandais : Gele knotszwam
(NO) : norvégien : Gul småkøllesopp Skjeggriske
(PL) : polonais : Goździeniowiec miodowy
(SE) : suédois : Hagfingersvamp
(SK) : slovaque : Pakonárovka žltoranžová
(CZ) : tchèque : Kyjovečka hnědá

11/12/2009 -18/03/2012 -