



Base de données mycologique

Clavulinopsis helvola (L. : Fr.) Corner 1950

Clavaire lumineuse



- Division - Classe - Ordre - Famille

Basidiomycota / Homobasidiomycetes / Clavariales / Clavariaceae

- Synonymes

Clavaria helvola Pers. 1797

Ramariopsis helvola (Pers.) R.H.Petersen 1978

Donkella helvola (Pers.) Malysheva & Zmitr. 2006

Clavaria flammans Berk. 1875

Clavaria similis Boud. & Pat. 1888

- Carpophore

- **Couleur** : Jaune

- **Description** : Fructification filiforme ou étroitement clavée, le plus souvent ondulée, tordue ou torsadée, 10-60 x 1,5-4 mm, cylindrique, + ou - arrondie (à peu près aplatie et sillonnée longitudinalement dans la variété geoglossoides (Corner) . Surface lisse ou faiblement inégale, jaune d'oeuf mais plus pâle vers la base ; extrémités pointues, non ramifiées, ou , plus rarement avec une seule fourche. Pleine.

- Hyménophore

Hyménium s'étalant sur l'ensemble à l'exception d'une zone + ou -nette sur le pied qui est plus pâle.

- Chair

Jaune pâle, fibreuse et ferme, odeur insignifiante , douce, saveur indistincte.

- Spores

Largement elliptiques à arrondies, ornées de grossières verrues obtuses, uniguttulées, hyalines, (ou faiblement jaunes) 4-7 x 4-5,5 µm, (sans les verrues). Basides étroitement clavées, bi ou tétrasporiques, bouclées. Pas de cystide. Monomitique : Hypes larges , bouclées.

- Ecologie

- **Habitat** : Sol

- **Description** : Pousse dans la mousse, l'herbe, dans les prés moussus des forêts de feuillus, les pelouses.

- Comestibilité

Sans intérêt

- Références bibliographiques

CD 117 ; Eyssartier et Roux p. 1012 ; Phillips p. 258 ; Bon p. 308 ; Cetto 3 p. 459 ; BG p. 184 . BK 2 p. 348

- Commentaires

Isolé, plus rarement fasciculé, souvent grégaire. Rare. Été-automne.