

Nom usuel : tramète parfumé



Synonymes : polyporus suaveolens

Chapeau : de 4 à 10 cm de largeur, en forme de console de 3 à 7 cm de profondeur, épaisse (de 2 à 4 cm) et de section triangulaire (de profil), bombée, à cuticule veloutée ou tomenteuse à feutrée à l'état juvénile, de couleur blanche, blanchâtre à blanc grisâtre puis devenant gris jaunâtre très pâle en vieillissant

Lames : néant : pores assez larges (1 à 3 au mm) arrondis à anguleux sur tubes de 10 à 15 mm de longueur, de couleur blanche puis devenant ochracé grisâtre pâle puis brun ochracé en vieillissant

Anneau : néant

Pied : néant : fixé latéralement sur le support par la partie la plus épaisse, dans le prolongement du carpophore

Exhalaison : anisée, suave et bien marquée

Période de cueillette : à partir de la fin de l'été et jusqu'à la fin de l'automne

Biotopes : essentiellement sur les troncs et branches mortes des feuillus mais aussi parfois sur arbres malades, appréciant notamment les peupliers et les saules

Confusions : impossible en raison de l'odeur caractéristique

Famille : coriolacées

Nom scientifique : tramete suaveolens

Commentaires

La chair est de couleur blanche et les spores sont hyalines. Ce champignon rare se développe isolément ou en petites troupes de quelques individus. Sa chair molle et subéreuse le rend impropre à la consommation et le classe parmi les espèces non comestibles.

[Retour](#)