

**Diferenças entre as alterações no esquema vacinal do Ministério da Saúde a partir de 04/01/2016 e as orientações da Sociedade Brasileira de Pediatria e Sociedade Brasileira de Imunizações:**

| VACINA        | PROGRAMA NACIONAL DE IMUNIZAÇÕES                                                                              | SOCIEDADE BRASILEIRA DE PEDIATRIA                                                                                                                 |
|---------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Poliomielite  | Três doses com VIP + campanhas e reforços com VOP                                                             | Três doses com VIP + reforços com VIP e campanhas com VOP                                                                                         |
| Pneumocócica  | Pneumocócica 10 valente<br>Duas doses (2 e 4 meses) + reforço aos 12 meses, podendo ser tomado até os 4 anos. | Pneumocócica 13 valente<br>Três doses (2, 4 e 6 meses) + reforço aos 12 a 15 meses.                                                               |
| Hepatite A    | Dose única aos 15 meses, podendo ser administrada até os 23 meses.                                            | Duas doses (12 e 18 meses)                                                                                                                        |
| HPV           | Duas doses (0, 6 meses) para meninas de 9 a 13 anos.                                                          | Três doses (0, 2, 6 meses) para meninos e meninas a partir de 9 anos.                                                                             |
| Meningocócica | Duas doses, aos 3 e 5 meses + reforço aos 12 meses, podendo ser feito até os 4 anos da meningocócica C.       | Duas doses, aos 3 e 5 meses da meningocócica C + reforço aos 12 a 15 meses + reforço com 5 anos e com 11 anos com a meningocócica ACWY conjugada. |

Fonte: Ministério da Saúde, Sociedade Brasileira de Pediatria e Sociedade Brasileira de Imunizações.  
Aptado por Dra Cleonir de Moraes Lui Beck