

Usages de drogues

Depuis 1987, les seringues sont en vente libre sans ordonnance dans les pharmacies.

Où trouver des informations et/ou des seringues ?

Autres associations, les pharmacies et lieux d'accueil spécialisés.

Comment éviter la transmission du VIH ou des hépatites ?

Désinfecter la peau avec de l'alcool avant de piquer et suivre les conseils ci-dessous:

- Ne jamais prêter, ni emprunter ou réutiliser une seringue.
- Ne jamais prêter ou emprunter une cuillère. La désinfecter avant chaque utilisation.
 - Ne jamais partager le filtre ou le coton.
 - Ne jamais partager le produit de seringue à seringue.

Il existe aujourd'hui des médicaments de substitution (Subutex, Méthadone...) si vous souhaitez maîtriser ou arrêter votre usage de drogues opiacées (héroïne, etc.) ou de médicaments opiacés détournés (Néocodion, Skenan, etc.).

Demandez conseil à votre médecin.

1 personne = 1 seringue

Bien que ce ne soit pas recommandé, le Subutex est assez souvent consommé par injection. L'injection du Subutex peut gravement abîmer les veines. Pour limiter les dégâts, il faut bien filtrer le produit avant injection.

Le sniff, le piercing et le tatouage peuvent être des portes d'entrée pour le VIH, mais surtout pour le virus de l'hépatite C (VHC).

- Pour le sniff, évitez de partager votre paille avec d'autres personnes ;
- Pour le piercing et le tatouage, préférez vous rendre chez un professionnel qui dispose d'un autoclave (appareil stérilisant la pince dans le cas du piercing et l'aiguille dans le cas du tatouage), ou préférez le matériel à usage unique.