

Кейс 2: Страна Холодного моря.

Заболеваемость туберкулезом в стране снижается и в 2017 году составила 50 на 100 000 населения.

По официальным данным, случаи коинфекции ТБ/ВИЧ составляют 3% от всех случаев туберкулеза. Анализ доступа к методам выявления и диагностики показал, что в стране не используются быстрые тесты для диагностики туберкулеза (Xpert MTB/RIF), что приводит к задержке в диагностике туберкулеза и отсрочке лечения. Среднее время от первого обращения за помощью до начала лечения составляет от 4 до 8 недель.

Охват тестированием на ВИЧ среди новых случаев ТБ снизился с 83,7% в 2012 году до 67,1% в 2013, в 2017 он составил 79%. Тестирование на ВИЧ предлагается только пациентам из числа новых случаев туберкулеза после подтверждения диагноза, и не предлагается пациентам с подозрением на туберкулез.

Данных об охвате АРТ пациентов с коинфекцией ВИЧ/ТБ нет. Критерием назначения АРТ в стране до настоящего времени является уровень СД4 350 кл/мкл.

Как результат, снижается эффективность лечения туберкулеза: для пациентов с коинфекцией ТБ/ВИЧ – 57%.

Задание:

Какие ключевые проблемы Вы видите?

Определите ключевые цели адвокации.

Какие направления адвокации Вы выберете?

Поддержкой каких партнеров следует заручиться?